

Viburnum lantana L.

Viorne mancienne



Caractéristiques de l'espèce

Famille : Caprifoliadées

Aire de répartition : commune presque partout mais rare en région méditerranéenne, absente de Bretagne et des Landes. Jusqu'à 1500 m : étages collinéen et montagnard, étage supraméditerranéen

Données autécologiques : espèce héliophile ou de demi-ombre, sols riches en bases ; pH basique à très légèrement acide, stations xérophiles à mésohygrophiles, espèce à large amplitude hydrique

Biotopie primaire : lisières et clairières forestières

Morphologie : arbrisseau de 1 à 3 m

Critères de fiabilité : feuilles entières et dentées, caduques, cordées à la base, épaisses, tomenteuses grisâtre dessous, sans stipules, baies ovoïdes comprimées

Caractéristiques biologiques : hermaphrodite

Vecteur de pollinisation : entomophile

Dissémination : endozoochorie

Sensibilité à l'hybridation :

Allogame/autogame :

Proportion de plants attendus/nombre de fruits récoltés :

Aptitude à la germination en semis direct :

Durée de viabilité des graines :

Récolte

Epoque de récolte (fourchette suivant région) : fin juillet/début août

Fourchette de récolte : une semaine

Distance entre les pieds à récolter : récolter sur 10 sujets répartis sur la station en cas de population constituée de sujets isolés, sur des individus espacés d'au moins 10 m en cas de population abondante, ne pas récolter plus d'1/4 des fruits portés par chaque individu si la densité est faible sur la zone

Qualités visuelles du fruit à récolter : baie noire pulpeuse à récolter encore rouge non sèche pour dépulpage facile. Si le fruit est noir, la graine est entrée en dormance

Étiquetage : identifiant du bénéficiaire, nom du collecteur si différent, numéro de référence du lot, site de récolte, espèce, date, habitat



Nettoyage-extraction des graines

Temps requis/quantité : 30 000/heure

Technique utilisée : dépulper rapidement après récolte : la baie sèche est difficile à dépulper. Egrapper puis frottement des fruits sur un tamis sous un filet d'eau

Séchage des graines : 48 h dans une pièce ventilée. Attention : séchage partiel, maintenir les graines humides pour conditionnement

Tri des graines : flottaison

Teneur en eau des graines entreposées :

Température : chambre froide (0 à 2° C)

Étiquetage : identifiant du bénéficiaire, nom du collecteur si différent, numéro de référence du lot, site de récolte, espèce, date, habitat

Conditionnement/entreposage : sachet ou boîte fermée étiqueté dessus et dedans

Levée de dormance-semis

Durée de levée de dormance : 3 mois

Proportion de graines germées/mises en stratification : 50 %

Début : début ou mi-janvier

Méthode : stratification froide (3° C à 5° C)

Suivi technique : peu de surveillance

Quand semer : au bout de 3 mois

Préparation du lit de semis : tourbe écorce

Semis : en plein en cagette à la volée

Date : mi-avril

Repiquage des plantules : en paniers alvéolés (36/220 cc)

Date : à partir de début mai pendant un mois

Étiquetage : identifiant du bénéficiaire, nom du collecteur si différent, numéro de référence du lot, site de récolte, espèce, date, habitat

Si fruit rouge, stratification immédiate après nettoyage en automne et semis en mars

Si fruit noir la graine est bloquée 2 ans (dormance 2 ans)

